

# DEA MDFI

## Examen de Logique

Jeudi 6 janvier 2000

On rappelle que si  $A$  est une formule de la logique linéaire, sa duale  $A^\perp$  est définie par les lois de de Morgan.

### CALCUL DES SQUENTS LINAIRE

On se place dans le fragment MELL de la logique linéaire, c'est-à-dire que l'on ne considère que les formules construites avec : les constantes  $\perp$  et  $1$ , les formules atomiques, les connecteurs  $\wp$  et  $\otimes$  et les modalités  $!$  et  $?$ .

**Question 1** Donner une démonstration du squeut  $\vdash ?A^\perp, ?B^\perp, !(A \otimes B)$ .

On définit les formules *positives* et *ngatives* par :

- la constante  $\perp$  est ngative, la constante  $1$  est positive ;
- si  $A$  est une formule de MELL alors  $?A$  est ngative et  $!A$  est positive ;
- si  $N_1$  et  $N_2$  (resp.  $P_1$  et  $P_2$ ) sont ngatives (resp. positives) alors  $N_1 \wp N_2$  est ngative (resp.  $P_1 \otimes P_2$  est positive).

**Question 2** Montrer que  $A$  est ngative ssi  $A^\perp$  est positive.

**Question 3** Montrer par récurrence sur  $P$  que si  $P$  est positive alors  $\vdash P^\perp, !P$  est démontrable.

**Question 4** En déduire que les règles structurelles sont *admissibles* pour toutes les formules ngatives c'est-à-dire que, si  $N$  est une formule ngative et  $\Gamma$  un contexte de formules de MELL :

**affaiblissement** si  $\vdash \Gamma$  est prouvable alors  $\vdash N, \Gamma$  est prouvable ;

**contraction** si  $\vdash N, N, \Gamma$  est prouvable alors  $\vdash N, \Gamma$  est prouvable ;

**promotion** si  $\vdash A, N, ?\Gamma$  est prouvable alors  $\vdash !A, N, ?\Gamma$  est prouvable.

### SÉMANTIQUE COHRENTE

On étudie ici une alternative à la présentation des espaces cohérents vue en cours. On dira que deux ensembles  $u$  et  $u'$  sont *orthogonaux*, et on écrira  $u \perp u'$  si  $u \cap u'$  a au plus un élément. Soient  $A$  un ensemble et  $C$  un ensemble de parties de  $A$ . On pose

$$C^\perp = \{u' \subseteq A \mid \forall u \in C, u' \perp u\}.$$

**Question 1** Montrer que  $C \subseteq C^{\perp\perp}$  et  $C^{\perp\perp\perp} = C^\perp$ .

On appellera *espace cliquaux* une paire  $E = (|E|, C(E))$  o  $|E|$  est un ensemble et  $C(E)$  est un ensemble de parties de  $|E|$  qui vrifie  $C(E)^{\perp\perp} = C(E)$ . Remarquons que la question 1 montre que si  $E$  est un espace cliquaux alors la paire  $(|E|, C(E)^{\perp})$  est un espace cliquaux, que l'on notera  $E^{\perp}$ . La question suivante tablit une proprit gnrale des espaces cliquaux qui servira dans la suite (en particulier pour rsoudre les questions 5 et 6).

**Question 2** Montrer que si  $E = (|E|, C(E))$  est un espace cliquaux alors :

- pour tout  $a \in |E|$ ,  $\{a\} \in C(E)$  ;
- pour tout  $u \in C(E)$  et tout  $v \subseteq u$ ,  $v \in C(E)$ .

Si  $X = (|X|, \circ_X)$  est un espace cohrent, on dsigne par  $\text{Cl}(X)$  l'ensemble de ses cliques.

**Question 3** Montrer que si  $X$  est un espace cohrent alors  $\text{Cl}(X^{\perp}) = \text{Cl}(X)^{\perp}$  (dans cette quation, la notion d'orthogonalit utilise gauche est celle des espaces cohrents, et celle utilise droite est la nouvelle notion d'orthogonalit dfinie ci-dessus).

**Question 4** En dduire que  $X^{-} = (|X|, \text{Cl}(X))$  est un espace cliquaux et que  $(X^{\perp})^{-} = (X^{-})^{\perp}$ .

Si  $E$  est un espace cliquaux, on dsigne par  $\circ_{E^{+}}$  la relation binaire sur  $|E|$  dfinie par :  $a \circ_{E^{+}} b$  si et seulement si  $\{a, b\} \in C(E)$ .

**Question 5** Montrer que si  $E$  est un espace cliquaux alors  $E^{+} = (|E|, \circ_{E^{+}})$  est un espace cohrent (la relation  $\circ_{E^{+}}$  tant clairement symtrique, il suffira de montrer qu'elle est rflexive).

**Question 6** Montrer que si  $E$  est un espace cliquaux alors  $(E^{\perp})^{+} = (E^{+})^{\perp}$  (l'une des inclusions se dmontre en utilisant la question 2).

**Question 7** Montrer que si  $X$  est un espace cohrent alors  $(X^{-})^{+} = X$  et que si  $E$  est un espace cliquaux alors  $(E^{+})^{-} = E$ .

**Question 8** Soient  $E$  et  $F$  deux espaces cliquaux et soit  $f \subseteq |E| \times |F|$ . Montrer que les deux proprits suivantes sont quivalentes.

- $f \in \text{Cl}(E^{+} \multimap F^{+})$
- Pour tout  $x \in C(E)$  et pour tout  $y' \in C(F^{\perp})$ , on a  $f \perp (x \times y')$ .

On dfnit l'espace cliquaux  $E \multimap F$  par  $|E \multimap F| = |E| \times |F|$  et

$$C(E \multimap F) = \{x \times y' \mid x \in C(E) \text{ et } y' \in C(F^{\perp})\}^{\perp}.$$

On vient donc de voir que  $(E \multimap F)^{+} = E^{+} \multimap F^{+}$  (dans cette quation, l'implication linare utilise gauche est celle des espaces cliquaux et celle utilise droite est l'implication linare des espaces cohrents).

**Question 9** De mme donner des dfnitions directes pour  $E \wp F$  et  $E \otimes F$ .

**Question 10** Soit  $E$  un espace cliquaux. Si  $x \in C(E)$ , on dsigne par  $x^{\dagger}$  l'ensemble des parties finies de  $x$ . Montrer que  $x^{\dagger} \in C((!(E^{+}))^{-})$ .

**Question 11** Montrer que  $C((!(E^{+}))^{-}) = \{x^{\dagger} \mid x \in C(E)\}^{\perp\perp}$ . En dduire une dfnition de  $!E$  (pour  $E$  espace cliquaux) qui vrifie  $(!E)^{\perp} = !(E^{+})$ .

## SMANTIQUE DES PHASES

On se place dans le fragment multiplicatif sans atome de la logique linéaire, c'est--dire que les formules sont construites en utilisant uniquement les constantes multiplicatives  $1$  et  $\perp$  et les connecteurs multiplicatifs  $\otimes$  et  $\wp$ .

Soit  $\mathbb{Z}$  l'ensemble des entiers relatifs que l'on considère comme un monode commutatif pour l'addition. On définit un module des phases  $C = (\mathbb{Z}, \perp_C)$  où  $\perp_C = \{1\}$ .

**Question 1** Montrer qu'une partie  $F$  de  $\mathbb{Z}$  non triviale, c'est--dire non vide et distincte de  $\mathbb{Z}$  tout entier, est un fait ssi  $F$  est un singleton  $\{n\}$  pour un entier  $n$  de  $\mathbb{Z}$ .

Si  $F$  est un fait non trivial, on note  $F \downarrow$  l'entier  $n$  tel que  $F = \{n\}$ .

**Question 2** Soient  $F = \{n\}$  et  $G = \{p\}$  deux faits ; calculer  $(F^\perp) \downarrow$ ,  $(F \otimes G) \downarrow$  et  $(F \wp G) \downarrow$ .

On note  $|A|_\perp$  le nombre d'occurrences de  $\perp$  dans  $A$  et  $|A|_\wp$  le nombre d'occurrences de  $\wp$  dans  $A$ .

**Question 3** Montrer que si  $A$  est une formule alors  $A^\bullet$  est un fait non trivial. Montrer que dans le module  $C$ ,  $(A^\bullet) \downarrow = |A|_\perp - |A|_\wp$ .

**Question 4** En déduire que si  $A$  est prouvable alors  $|A|_\perp = |A|_\wp$ .

**Question 5** Donner une formule  $A$  non prouvable telle que  $|A|_\perp = |A|_\wp$ .